

قارچ کشتهای ثبت شده از سال ۱۳۸۶ تا اول مرداد ۱۳۹۵

تاریخ ثبت	دوز مصرف	کارنس	محصول	بیماری	شرکت	فرمولاسیون	درصد	نام تجاری	نام عمومی
۹۲/۳/۲۷	۰/۵ لیتر در هکتار	۴۲ روز	گندم	بیماری فوزاریمی سنبله	ب آ اس اف	SC	٪۴۹/۷	رکس دو	اپوکسی کونازول+تیوفانات متیل
۸۸/۹/۳۰	مزرعه: یک لیتر در هکتار گلخانه: ۰/۷۵ در هزار	خیار: ۲ روز گوجه فرنگی: ۳ روز	جالیز-مزرعه- گلخانه	سفیدک پودری	سینجنتا	SC	٪۳۲/۵	آرتیواتاپ	آزوکسی استروبین +دیفنو کونازول
۹۲/۸/۲۷	۰/۷۵ لیتر در هکتار	۳۵ روز	گندم	زنگ زرد	سینجنتا	SC	٪۲۸	آمیستاراکسترا	آزوکسی استروبین +اسپیروکونازول
۹۲/۸/۲۷	۰/۶ لیتر در هکتار	۳۰ روز	گندم	زنگ زرد	بایر	SC	٪۴۶	فالکن	اسپیروکسامین+تبوکونازول+تریادیمنول
۹۴/۳/۲۵	۰/۷-۰/۸ لیتر در هکتار	۳۰ روز	گندم	فوزاریوم سنبله	بایر	SC	٪۴۶	فالکن	اسپیروکسامین+تبوکونازول+تریادیمنول
۹۴/۶/۲۳	۳ کیلو در هکتار	۵ روز	خیار	سفیدک داخلی	اگریا	WP	٪۴۳/۹۵	کوپروسیت سی	اکسی کلرور مس+سیموکسانیل
۹۱/۶/۲۰	۱ در هزار	۱۵ روز	درختان میوه دانه دار	آتشک	نوردوکس آ.آس نروژ	WG	٪۷۵	نوردوکس	اکسید مس
۹۰/۴/۱۳	۲/۵ در هزار	۱۵ روز	هلو	پیچیدگی برگ	نوردوکس آ.آس نروژ	WG	٪۷۵	نوردوکس	اکسید مس

۹۴/۷/۶	۱ کیلو گرم در هکتار	۱۵ روز	سیب زمینی	سفیدک دروغی	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	٪۷۵	نوردوکس	اکسید مس	
۸۶/۱۰/۱۰	٪۲ وزن غده	----	سیب زمینی	شانکر ریزوکتونیایی ساقه وشوره سیاه غده	بایر	WP	٪۵۰	رورال	ایپودیون	۷
۹۲/۴/۱۷	۰/۷۵-۰/۵ کیلو در هکتار	۱ روز	خیار	سفیدک پودری	نیون سودا	WP	٪۴۰	بلکیوت	ایمونکتادین تریس	۸
۹۳/۳/۱۲	۷۵۰ گرم در هکتار	۷روز	سیب زمینی	لکه موجی (آلترناریا)	نیون سودا	WP	٪۴۰	بلکیوت	ایمونکتادین تریس	
۹۳/۱۲/۴	۱۰ در هزار دو مرحله	۷ روز	زردآلو	بیماری غربالی	سبزآورپردیس	SC	٪۱۸	میشو بردوکس	بردو	۹
۹۴/۱۰/۷	۲ درصد محلولپاشی توام با پانسمان شانکر با بردو کیمیا ۸ درصد		درخت سیب	شانکر سیتوسپرای	کاوش کیمیا کرمان	SC	٪۱۸	بردو کیمیا	بردو	۱۰
۸۹/۹/۲۹	۰/۷ در هزار مناطق خشک ۱ در هزار مناطق مرطوب	۷ روز	هلو-شلیل	سفیدک سطحی	ب آ اس اف	WG	٪۳۸	بلیس	بوسکالید+ پیراکلوستروبین	۱۱
۹۴/۱۲/۱۰	۰/۵ کیلو گرم در هکتار		گوجه فرنگی	آلترناریا	ب آ اس اف	WG	٪۳۳/۴	سیگنوم	بوسکالید+ پیراکلوستروبین	۱۲
۹۵/۳/۱۷	۰/۵ کیلو گرم در هکتار		سیب زمینی	آلترناریا	ب آ اس اف	WG	٪۳۳/۴	سیگنوم	بوسکالید+ پیراکلوستروبین	
۸۹/۹/۲۹	۰/۵ در هزار	۷ روز	هلو-شلیل	سفیدک سطحی	ب آ اس اف	SC	٪۳۰	کولیس	بوسکالید+ کروزکسیم متیل	۱۳
۹۰/۱۲/۱	۵در هزار	----	جالیز- گلخانه	سفیدک پودری	کیمیا سبز آور	SP	٪۸۵	کالیبان	بی کرنات پتاسیم	۱۴
۸۹/۳/۱۰	۱۵-۱۰ میلی لیتر برای یکصد کیلو گرم بذر	----	گندم	سیاهک پنهان معمولی	بایر	FS	٪۴۰	لاماردور	پروتیوکونازول+توکونازول	۱۵
۸۹/۹/۱	۲۰ میلی لیتر برای یکصد	----	گندم	سیاهک آشکار	بایر	FS	٪۴۰	لاماردور	پروتیوکونازول+توکونازول	

	کیلو گرم بذر									
۹۲/۷/۸	۳ لیتر در هکتار در مزرعه به صورت نشتی در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۰/۳ لیتر در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	۳ روز	خیار	بوته میری	بایر	SL	٪۸۴	پرویکورانترژی	پروپامو کارب هیدرو کلراید وفوزتیل آلومینیوم	۱۶
۹۲/۸/۲۷	۲ در هزار	۱ روز	خیار-گلخانه	سفیدک کرکی	بایر	SC	٪۶۸/۷۵	اینفینیتو	پروپامو کارب هیدرو کلراید+فلوپیکولید	۱۷
۹۴/۷/۶	۱/۲ لیتر در هکتار	۷ روز	سیب زمینی	سفیدک دروغی	بایر	SC	٪۶۸/۷۵	اینفینیتو	پروپامو کارب هیدرو کلراید+فلوپیکولید	۱۸
۹۴/۷/۶	۲/۵ لیتر در هکتار	***	سیب زمینی	سفیدک دروغی	اگریفار	SC	٪۴۵	پروکسانیل	پروپامو کارب هیدرو کلراید+سیمو کسانیل	۱۸
۹۲/۸/۲۷	۰/۹ گرم در هر مترمربع	***	قارچ خوراکی	پوسیدگی خشک	فرتی اگرو	WP	٪۵۰	آکورد	پروکلراز	۱۹
۸۶/۲/۳	۱/۲۵ در هزار (ضد عفونی بذر)	---	سیب زمینی	شانکر ریزوکتونیایی ساقه و شوره سیاه غده	بایر	WP	٪۲۵	مونسرن	پنسکرون	۲۰
۹۴/۳/۱۱	۱ لیتر در هکتار	***	ساقه کلزا	پوسیدگی اسکلروتنیایی	بایر	EW	٪۲۵	فولیکور	تبوکونازول	۲۱
۸۸/۸/۱۱	۰/۵ لیتر در هکتار در مزرعه	۳ روز	جالیز	سفیدک پودری	ایزاگرو	EC	٪۱۰	دومارک	تتراکونازول	۲۲

	و ۰/۴ در هزار در گلخانه									
	۹۲/۳/۲۷	۰/۳ در هزار	۱۴ روز	سیب	سفیدک پودری	ایزاگرو	EC	٪۱۰	دومارک	تتراکونازول
۲۳	۸۹/۱۰/۱۳	۱۰۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	---	گندم	سیاهک آشکار	ایزاگرو	LS	٪۱۲/۵	لوسپل	تتراکونازول
	۸۹/۱۰/۱۳	۳۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	---	گندم	سیاهک پنهان	ایزاگرو	LS	٪۱۲/۵	لوسپل	تتراکونازول
۲۴	۹۰/۷/۴	۰/۸-۱ لیتر در هکتار	۲۱ روز	چغندر قند	سفیدک پودری	ایزاگرو	ME	٪۱۲/۵	امی ننت	تتراکونازول
۲۵	۸۹/۳/۱۰	۱۵۰ گرم برای یکصد کیلوگرم بذر	----	جو	سیاهک آشکار	بایر	DS	٪۷/۵	بایتان	تریادیمنول
۲۶	۸۹/۳/۱۰	۲۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم بذر	----	جو	سیاهک آشکار	ب آ اس اف	FS	٪۲۰	رنال	تری تیکونازول
۲۷	۸۸/۸/۱۱	۲۰۰ گرم در هکتار	۱ روز	جالیز-مزرعه	سفیدک پودری	بایر	WG	٪۵۰	فلینت	تری فلوکسی استروبین
۲۸	۹۲/۳/۶	۱۶۰ گرم در هکتار	۲۱ روز	برنج	بلاست	بایر	WG	٪۷۵	ناتیوو	تری فلوکسی استروبین+تبوکونازول
	۹۴/۵/۱۲	۰/۳-۰/۲ در هزار	۱۴ روز	سیب	لکه سیاه	بایر	WG	٪۷۵	ناتیوو	تری فلوکسی استروبین+تبوکونازول
۲۹	۸۰/۳/۲۱	----	----	مرکبات	انبارداری	---	WAX	٪۰/۷	سیترازول آ	تیابندازول+ایمازالیل
۳۰	۹۰/۳/۳۰	۰/۴-۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۲۱ روز	برنج	بلاست برگ و خوشه	نیپون سودا ژاپن	WP	٪۷۲/۵	ویستا	تیوفانات متیل+تری سیکلازول
۳۱	۸۹/۳/۱۰	۲۰۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	----	جو	سیاهک آشکار	سینجنتا	FS	٪۳/۶۳	دیویدند استار	دیفنو کونازول+سایپرو کونازول
	۸۹/۹/۱	۱۰۰ میلی لیتر برای	----	گندم	سیاهک آشکار	سینجنتا	FS	٪۳/۶۳	دیویدند استار	دیفنو کونازول+سایپرو کونازول

	یکصد کیلو گرم بذر								
۹۴/۱۲/۱۰	۲ لیتر در هکتار	۳ روز	گوجه فرنگی	آلترناریا	ب آ اس اف	EC	٪۱۱/۲	کابریو دو	دیمتومورف+پیراکلوستروبین
۹۴/۸/۲۵	۲ کلوگرم در هکتار	۷ روز	سیب زمینی	سفیدک کرکی	ب آ اس اف	WG	٪۶۹	آکروبات ام زد	دیمتومورف+مانکوزب
۹۴/۳/۱۱	۱ لیتر در هکتار	***	ساقه کلزا	پوسیدگی اسکلروتنیایی	سینجنتا	SC	٪۴۲	آلتوکمبی	سایپروکونازول+کاربندازیم
۹۱/۳/۸	۰/۴-۰/۵ در هزار	۳ روز	خیار-گلخانه	سفیدک کرکی	ایشیهارا	SC	٪۴۰	رانمن	سیازوفامید
۹۴/۷/۶	۰/۱۵ لیتر در هکتار	***	سیب زمینی	سفیدک کرکی	ایشیهارا	SC	٪۴۰	رانمن	سیازوفامید
۹۲/۴/۱۷	۳ کیلوگرم در هکتار	۱ روز	خیار	سفیدک پودری	بیسترفیلد	WG	٪۸۰	سولفولاک	سولفور
۹۲/۸/۲۷	۲/۵ در هزار		انگور	سفیدک پودری	سمیران	SC	٪۸۰	گوگرد سمیران	سولفور
۹۳/۶/۱۰	۳/۷۵ در هزار	۲۰ روز	شلیل	سفیدک پودری	ارکیده سازان	SC	٪۴۰	سولفور ارکیده سازان	سولفور
۹۲/۱۲/۵	۲/۵ در هزار	۳۰ روز	پسته	گموز	شاندونگ داچنگ	WG	٪۸۰	الیت	فوزتیل آلومینیوم
۸۷/۵/۲	۰/۲ در هزار	۴ روز	کدوئیان	سفیدک پودری	ب آ اس اف	WG	٪۵۰	استروبی	کروزکسیم متیل
۹۳/۴/۲	۳۰ گرم در یک لیتر آب و کاربرد بروش رنگ آمیزی	---	مرکبات	گموز	ماسو	WP	٪۶۵	آلیادوسی تی ال	مانکوزب + کلروتالونیل +سیموکسانیل
۸۶/۸/۲۸	یک بسته ۷ گرمی برای نگهداری ۵ کیلوگرم انگور	---	انگور	بیماریهای قارچی	اروم زرین خوشه	پد کاغذی	۷ گرم متابی سولفیت	سولفور پد	متابی سولفیت سدیم

۹۳/۲/۱۵	۲ در هزار در مزرعه به صورت محلول ریزی پای بوته و در گلخانه به منظور ضدعفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۲۰۰ گرم در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	۷ روز	خیار	بوته میری در مزرعه و گلخانه	بهاور شیمی	WP	٪۷۲	رزالاکسیل	متالاکسیل + مانکوزب	۴۳
۹۴/۷/۶	۳ کیلو گرم در هکتار	۷ روز	سیب زمینی	سفیدک کرکی	بهاور شیمی	WP	٪۷۲	رزالاکسیل	متالاکسیل + مانکوزب	